

نوعية الحياة والالتزام بالأدوية بين المرضى البالغين بعد تنفيذ إجراء الشريان التاجي عن طريق الجلد (البالون أو الدعامة)

الطالبة: سندس النوايسة

المشرف : د. مجدي الزعبي

الملخص :

المقدمة: الخلفية: يعد مرض القلب التاجي

أحد الاهتمامات الصحية العالمية الرئيسية، حيث يعد التدخل التاجي عن طريق الجلد

علاجًا شائعًا.

يعد الالتزام بالأدوية بعد القسطرة

أمرًا بالغ الأهمية لتحسين النتائج ونوعية الحياة.

الهدف: تبحث هذه الدراسة في العوامل المرتبطة بالالتزام بالدواء وجودة الحياة بين المرضى البالغين بعد إجراء التدخل التاجي عن طريق الجلد(القسطرة)

الطريقة: أجريت دراسة مقطعية في مستشفى الأمير حمزة ومستشفى عمان الجراحي. تم اختيار مجموعه من المرضى بلغت

197

مريضًا بالغًا خضعوا لقسطرة

باستخدام أخذ العينات الملائمة

تم جمع البيانات من خلال استبيان تم الإبلاغ عنه ذاتيًا، بما في ذلك المعلومات الاجتماعية والديموغرافية، ومقياس الالتزام بالأدوية موريسكي المكون من 8 عناصر ومقياس نوعية الحياة المكون من 26 عنصر وتم تحليل البيانات من خلال MMAS-8برنامج)

SPSS

النتائج: بلغت نسبة الاستجابة 92.5%. وبلغت نسبة المشاركين 60.9% ذكور و39.1% إناث، وأغلبهم تتراوح أعمارهم بين 40-49 سنة. وكانت مستويات الالتزام بالأدوية منخفضة 61.4%، ومتوسطة 34.1%، ومرتفعة 4.6%. تم العثور على (P = 0.029) (P < 0.001) ارتباطات كبيرة بين الالتزام والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليم

، (r = 0.301) ، والصحة النفسية (r = 0.349) وقد لوحظت ارتباطات قوية بين مجالات الالتزام وجودة الحياة: الصحة البدنية . (P < 0.001) جميع (r = 0.492) ، والبيئة (r = 0.505) والعلاقات الاجتماعية

الخلاصة:

الاستنتاج:

يؤثر الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليم بشكل كبير على الالتزام بتناول الدواء وجودة الحياة لدى مرضى ما بعد

PCI مما يسلب الضوء على الحاجة إلى تدخلات مستهدفة لتحسين النتائج.

الكلمات المفتاحية: مرض القلب التاجي، التدخل التاجي عن طريق الجلد، الالتزام بالأدوية، جودة الحياة، الأردن